

Indicateurs Nationaux

Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2014)	Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2016)	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2014)	Taux d'inoculation entomologique (TIE) (2012)	Taux de mobilisation de ressources (2015)	Taux d'absorption des ressources allouées (2015)	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2014)	% des cas de paludisme graves confirmés vus dans les formations sanitaires ayant bénéficié d'un traitement approprié conformément aux directives nationales (2009)	% des cas de paludisme simples confirmés vus dans les formations sanitaires ayant bénéficié d'un traitement approprié conformément aux directives nationales (2009)
46%	82%	22%	2.5	79%	99%	67%	51%	64%
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	Rapport de MICS/EDS	Rapport d'enquête dans les FS	Rapport d'enquête dans les FS

Indicateurs Regionaux et District

Region	Prise en charge des cas			Chimioprevention			Gestion des achats et des stocks (GAS)	Lutte anti-vectorielle		Suivi-évaluation
	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires / % des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	Proportion des cas testé TDR/GE	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 2 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3- 59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR)	Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion d'Enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS
Burkina Faso	1.3	90	110	90	38	63			23	93
Boucle du Mouhoun	4.2	94	105	94	31	54			18	100
Cascades	0.3	85	117	85	37	74			35	100
Centre	0.8	84	144	84	31	47			18	75
Centre-Est	1.4	92	104	92	45	69			12	97
Centre-Nord	1.2	99	97	99	47	65			30	101
Centre-Ouest	0.7	87	112	87	45	67			22	92
Centre-Sud	0.2	97	97	97	41	62			15	98
Est	0.9	98	97	98	40	67			21	97
Hauts-Bassins	1.5	77	131	77	42	64			20	82
Nord	0.6	100	95	100	41	64			5	100
Plateau Central	1.4	88	112	88	44	131			69	97
Sahel	2.2	97	101	97	20	43			35	88
Sud-Ouest	1.2	87	108	87	38	61			23	100
Source:	ENDOS-BF	ENDOS-BF / ENDOS-BF	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF