

# Carte de Score pour le contrôle et l'élimination du paludisme : Burkina Faso (Q1/2020)

■ On track     Not applicable    ▲ Increase  
■ Progress     No data    ▼ Decrease  
■ Not on track



## Indicateurs Nationaux

| Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2017) | Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2017) | % des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017) | Taux de mobilisation de ressources | Taux d'absorption des ressources allouées | Taux d'exécution des activités | Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017) |
|--|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 17%  | 62%  | 58%   | 84%                                |   |                                |   |
| EMDS ou MICS   | Rapports SNIS Endos-BF   | Rapport d'enquête   | Rapports financiers annuels        | Rapports financiers annuels               | TBD                            | Rapport de MICS/EDS   |

## Indicateurs Régionaux et District

| Region            | Impact   |   | Prise en charge des cas           |   | Chimioprevention  |  | Gestion des achats et des stocks (GAS) | Lutte anti-vectorielle  |   |  | Suivi-évaluation   |   |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Incidence du paludisme confirme (pour 1000 hbts) | Taux de mortalité imputable au paludisme (pour 100 000) | Létalité attribuable au paludisme | Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires / % des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT | Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN | Proportion d'enfants 3-59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles) et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale |  | Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR) | Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine | Proportion d'enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine | Proportion de structures éligibles protégées par des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent au cours des 12 derniers mois | Taux de complétude des rapports mensuels SNIS |
| Burkina Faso      | ▲285   | ▲22.9   | ▲1.7                              | ▲98   | 94  | ▲58  | 95                                     | 57  | 13  | 0%   | ▲65  | 41  |
| Boucle du Mouhoun | ▲267   | ▲13.1   | ▲1.1                              | ▲90   | 98  | ▲58  | 90                                     | 63  | 15  | 0%   | 62   | ▲49   |
| Cascades          | ▲465   | ▲6.8  | ▲0.3                              | ▲91   | 94  | ▲56  | 97                                     | ▲29   | 6   | 0%   | ▲91  | ▲57   |
| Centre            | ▲128   | ▲65.8   | ▲6.9                              | 79  | 69  | ▲43  | 98                                     | ▲36   | 5   | 0%   | ▲41  | ▲18   |
| Centre-Est        | ▲323   | ▲18.1   | ▲1.2                              | ▲87   | 97  | ▲66  | 83                                     | ▲57   | 10  | 0%   | ▲85  | ▲53   |
| Centre-Nord       | ▲235   | ▲24.2   | ▲3.0                              | 99  | 99  | ▲63  | 98                                     | ▲38   | ▲16   | 0%   | ▲77  | ▲49   |
| Centre-Ouest      | ▲429   | ▲9.9  | ▲0.7                              | ▲94   | 97  | ▲70  | 95                                     | ▲69   | ▲9  | 0%   | ▲97  | ▲66   |
| Centre-Sud        | ▲285   | ▲6.1  | ▲0.6                              | ▲101  | 96  | ▲80  | 96                                     | ▲109  | ▲23   | 0%   | 64   | ▲51   |
| Est               | ▲289   | ▲29.5   | ▲1.7                              | 98  | 95  | ▲54  | 92                                     | 71  | ▲11   | 0%   | ▲89  | ▲62   |
| Hauts-Bassins     | ▲282   | ▲9.3  | ▲0.7                              | 95  | 97  | ▲65  | 100                                    | 75  | 22  | 0%   | 58   | ▲37   |
| Nord              | ▲295   | ▲6.0  | ▲0.5                              | 98  | 97  | ▲65  | 99                                     | ▲55   | ▲12   | 0%   | ▲77  | ▲69   |
| Plateau Central   | ▲337   | ▲4.4  | ▲0.4                              | 105   | 97  | ▲72  | 99                                     | ▲51   | ▲20   | 0%   | 65   | ▲35   |
| Sahel             | ▲119   | ▲30.2   | ▲2.8                              | 100   | 96  | ▲17  | 100                                    | ▲4  | 1   | 0%   | ▲42  | 12  |
| Sud-Ouest         | ▲616   | ▲22.7   | ▲0.7                              | ▲151  | 95  | ▲50  | 97                                     | ▲76   | ▲17   | 0%   | ▲91  | ▲74   |
| Source:           | ENDOS  | ENDOS   | ENDOS-BF                          | ENDOS-BF / ENDOS-BF   | ENDOS-BF  | Rapport CPS  | ENDOS-BF                               | ENDOS-BF  | ENDOS-BF  | TBD  | ENDOS-BF   | ENDOS-BF                                      |