

# Carte de Score pour le contrôle et l'élimination du paludisme : Burkina Faso (T2/2020)

■ Sur la voie      N'est pas applicable    ▲ Hausse  
  Progrès    □ No data    ▼ Baisse  
■ Pas sur la voie



## Indicateurs Nationaux

| Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2017) | Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2017) | % des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017) | Taux de mobilisation de ressources | Taux d'absorption des ressources allouées | Taux d'exécution des activités | Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017) |
|--|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 17%  | 62%  | 58%   | 84%                                |   |                                |   |
| EMDS ou MICS   | Rapports SNIS Endos-BF   | Rapport d'enquête   | Rapports financiers annuels        | Rapports financiers annuels               | TBD                            | Rapport de MICS/EDS   |

## Indicateurs Régionaux et District

| Region            | Impact   |   | Prise en charge des cas           |   | Chimioprevention  |  | Gestion des achats et des stocks (GAS)  | Lutte anti-vectorielle  |  |  | Suivi-évaluation                              |  |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
|                   | Incidence du paludisme confirme (pour 1000 hbts) | Taux de mortalité imputable au paludisme (pour 100 000) | Létalité attribuable au paludisme | Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires / % des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT | Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN | Proportion d'enfants 3-59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale | Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR) | Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine | Proportion d'enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine | Proportion de structures éligibles protégées par des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent au cours des 12 derniers mois | Taux de complétude des rapports mensuels SNIS | Taux de promptitude des rapports mensuels (SNIS) |
| Burkina Faso      | ▲148   | ▲16.1   | 1.7                               | 94  | ▲100  | ▲53  | ▲86   | 58  | 15   | 95%  | ▲56   | ▲76  |
| Boulcu du Mouhoun | ▲132   | 12.9  | ▲14.9                             | ▲239  | ▲197  | 57   | ▲97   | 60  | 18   | 0%   | ▲72   | ▲95  |
| Cascades          | ▲343   | 7.7   | ▲5.8                              | ▲193  | ▲195  | 52   | 95  | ▲38   | 8  | 0%   | ▲70   | ▲89  |
| Centre            | ▲78  | ▲8.3  | ▲76.0                             | ▲252  | ▲254  | ▲37  | 98  | ▲28   | 8  | 0%   | ▲20   | ▲43  |
| Centre-Est        | ▲140   | ▲43.1   | ▲1.9                              | ▲157  | ▲254  | ▲55  | ▲60   | 53  | 12   | 0%   | ▲59   | ▲77  |
| Centre-Nord       | ▲107   | ▲9.0  | ▲11.5                             | ▲373  | ▲326  | ▲52  | 98  | 40  | 13   | 0%   | ▲43   | ▲84  |
| Centre-Ouest      | ▲177   | ▲6.2  | ▲14.5                             | ▲151  | ▲370  | ▲58  | 97  | ▲56   | 7  | 0%   | ▲65   | ▲80  |
| Centre-Sud        | ▲116   | ▲4.8  | ▲1.1                              | 99  | 97  | 78   | 94  | ▲103  | 26   | 0%   | 66  | ▲88  |
| Est               | ▲201   | ▲9.8  | ▲9.7                              | ▲235  | ▲147  | 52   | 95  | 68  | 9  | 0%   | ▲50   | ▲84  |
| Hauts-Bassins     | ▲165   | ▲2.7  | ▲2.7                              | ▲258  | 96  | 62   | 99  | ▲82   | 24   | 0%   | ▲70   | ▲79  |
| Nord              | ▲131   | 5.1   | ▲4.3                              | ▲268  | ▲113  | ▲58  | 98  | ▲70   | ▲17  | 0%   | ▲87   | ▲93  |
| Plateau Central   | ▲72  | ▲2.8  | ▲0.8                              | ▲98   | ▲92   | ▲65  | 98  | ▲75   | 20   | 0%   | ▲49   | ▲59  |
| Sahel             | ▲58  | ▲11.9   | ▲2.7                              | 100   | 100   | 19   | ▲93   | ▲24   | ▲21  | 0%   | ▲15   | ▲48  |
| Sud-Ouest         | ▲417   | ▲138.7  | ▲14.0                             | ▲189  | ▲210  | 54   | 99  | 74  | 18   | 0%   | ▲56   | ▲82  |
| Source:           | ENDOS  | ENDOS   | ENDOS-BF                          | ENDOS-BF / ENDOS-BF   | ENDOS-BF  | Rapport CPS  | ENDOS-BF  | ENDOS-BF  | ENDOS-BF   | TBD  | ENDOS-BF                                      | ENDOS-BF   |