

Indicateurs Nationaux

Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2017)	Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2017)	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017)	Taux de mobilisation de ressources	Taux d'absorption des ressources allouées	Taux d'exécution des activités	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017)
17%	62%	58%	84%			
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	TBD	Rapport de MICS/EDS

Indicateurs Regionaux et District

Region	Impact		Prise en charge des cas			Chimio prevention		Gestion des achats et des stocks (GAS)	Lutte anti-vectorielle			Suivi-évaluation	
	Incidence du paludisme confirmée (pour 1000 hbts)	Taux de mortalité imputable au paludisme (pour 100 000)	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires	% des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3- 59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale		Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion d'Enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion de structures éligibles protégée par des pulvérisations intra domiciliaires à effet rémanent au cours des 12 derniers mois	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS	Taux de promptitude des rapports mensuels (SNIS)
Burkina Faso	⬆64	⬆3.2	⬆1.1	100	95	81		99	⬆85	55	0%	85	78
Boule du Mouhoun	⬆49	⬆2.6	⬆1.1	98	98	⬆80		94	99	54	0%	91	⬆87
Cascades	⬆77	⬆1.2	⬆0.3	97	⬆95	⬆101		100	89	42	0%	93	93
Centre	⬆41	⬆1.4	⬆0.5	105	77	⬆80		100	⬆60	30	0%	67	40
Centre-Est	⬆88	⬆11.6	⬆3.4	99	97	⬆90		99	⬆100	⬆43	0%	93	⬆84
Centre-Nord	⬆42	⬆4.8	⬆3.4	101	98	84		100	⬆93	⬆63	0%	82	⬆69
Centre-Ouest	⬆105	⬆3.9	⬆1.0	102	97	100		99	⬆103	⬆92	0%	99	⬆98
Centre-Sud	⬆80	⬆0.7	0.3	100	98	95		99	⬆100	77	0%	100	100
Est	⬆71	⬆2.1	⬆0.7	100	96	⬆68		97	⬆42	⬆22	0%	⬆86	84
Hauts-Bassins	⬆64	⬆1.0	⬆0.4	99	98	⬆81		100	⬆82	⬆45	0%	84	84
Nord	⬆42	⬆0.9	0.5	100	98	82		100	⬆96	⬆85	0%	86	⬆82
Plateau Central	⬆61	⬆2.9	⬆1.2	100	⬆97	⬆77		100	⬆107	108	0%	100	97
Sahel	⬆28	⬆2.8	⬆1.3	104	99	48		100	⬆76	⬆27	0%	⬆38	⬆22
Sud-Ouest	⬆143	⬆7.3	⬆1.1	100	98	⬆85		98	⬆117	⬆77	0%	100	⬆99
Source:	ENDOS	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	TBD	ENDOS-BF	ENDOS-BF