

Carte de Score Paludisme : Burkina Faso (Q4/2024)

■ On track Not applicable ▲ Increase
■ Progress No data ▼ Decrease
■ Not on track



Indicateurs Nationaux

Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2017)	Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2017)	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2017)	Taux de mobilisation des ressources	Taux d'absorption des ressources allouées	Taux d'exécution des activités	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2017)
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	TBD	Rapport de MICS/EDS

Indicateurs Régionaux et District

Region	Impact			Prise en charge des cas				Chimioprevention		Gestion des achats et des stocks (GAS)						Lutte anti-vectorielle			Suivi-évaluation	
	Incidence du paludisme confirmée (pour 1000 hbts)	Taux de mortalité imputable au paludisme (pour 100 000)	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR) dans la communauté (ASC)	% des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	Proportion de cas confirmés de paludisme simple ayant reçu un traitement aux ACT par les ASBC	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3-59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet par campagne conformément aux directives nationales	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (ACT)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (Artésunate)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (SP)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (MILDA)	Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion d'Enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion de structures éligibles traitées par la PID	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS	Taux de promptitude des rapports mensuels (SNIS)	
Burkina Faso	▲871	▲25.1	▲0.5	99	97	96	0	▲77		67	70	54	62	63	86			▲82	▲75	
Boucle du Mouhoun	▲668	▲26.4	0.7	97	96	95	0	▲64		59	63	46	▲55	▲54	▲94			▲72	▲67	
Cascades	▲707	▲13.9	0.3	98	100	99	0	▲72		92	93	▲52	▲88	▲84	96			99	97	
Centre	▲691	▲29.7	▲0.5	97	100	94	0	93		67	67	60	62	59	64			▲81	65	
Centre-Est	▲1,301	▲15.6	0.3	99	99	96	0	▲81		80	84	▲53	72	73	93			▲89	▲85	
Centre-Nord	▲718	▲21.9	▲0.7	100	100	99	0	▲76		52	51	46	46	49	94			▲68	▲65	
Centre-Ouest	▲1,112	▲21.0	▲0.6	99	99	95	0	▲79		▲79	85	72	▲77	▲77	99			96	93	
Centre-Sud	▲1,367	▲14.9	▲0.3	100	99	▲90	0	▲87		93	95	85	89	90	▲100			98	▲96	
Est	▲655	▲32.0	0.8	98	▲80	99	0	71		▲23	▲26	▲18	▲20	17	▲48			58	▲41	
Hauts-Bassins	▲716	▲19.7	0.4	98	100	99	0	▲78		83	92	76	▲76	82	▲90			▲92	▲89	
Nord	▲960	▲22.7	▲0.5	100	97	100	0	93		66	66	52	62	▲62	▲98			▲77	▲75	
Plateau Central	▲1,809	▲15.3	0.2	100	99	▲88	0	89		88	90	▲64	82	83	96			95	▲93	
Sahel	▲428	▲57.8	▲1.4	100	98	99	0	▲47		0	0	0	0	0	▲76			▲45	▲34	
Sud-Ouest	▲965	▲31.7	▲0.7	100	100	99	▲0	▲58		88	92	76	▲84	86	98			▲96	▲90	
Source:	ENDOS	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	TBD	ENDOS-BF	TBD	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport PID	ENDOS-BF	ENDOS-BF	