Carte de Score pour le contrôle et l'élimination du paludisme : Burkina Faso (T1/2017)

Sur la voie | N'est pas applicable | Hausse
Progrès | No data | Baisse
Pas sur la voie

Indicateurs Nationaux

Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (2014)	Taux de positivité des tests de diagnostic du paludisme (Microscopie et/ou TDR) (2016)	% des FE ayant reçu au moins trois doses de TPI durant leur dernière grossesse (2014)	Taux d'inoculation entomologique (TIE) (2012)	Taux de mobilisation de ressources (2015)	Taux d'absorption des ressources allouées (2015)	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête (2014)	% des cas de paludisme graves confirmés vus dans les formations sanitaires ayant bénéficié d'un traitement approprié conformément aux directives nationales (2009)	% des cas de paludisme simples confirmés vus dans les formations sanitaires ayant bénéficié d'un traitement approprié conformément aux directives nationales (2009)
46%	82%	22%	2.5	79%	99%	67%	51%	64%
EMDS ou MICS	Rapports SNIS Endos-BF	Rapport d'enquête	Rapport d'enquête	Rapports financiers annuels	Rapports financiers annuels	Rapport de MICS/EDS	Rapport d'enquête dans les FS	Rapport d'enquête dans les FS

Indicateurs Regionaux et District

Region	Prise en charge des cas			Chimioprevention			Gestion des achats et des stocks (GAS)					Lutte anti-vectorielle		Suivi-évaluation
	Létalité attribuable au paludisme	Proportion des cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un test parasitologique (TDR ou microscopie) au niveau des formations sanitaires / % des cas de paludisme simple qui ont bénéficié d'un traitement ACT	Proportion des cas testé TDR/GE	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 3 doses de TPI au cours des CPN	Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins 2 doses de TPI au cours des CPN	Proportion d'enfants 3- 59 mois qui ont bénéficié d'un traitement complet (4 cycles et les trois doses par cycle) dans les districts couverts avec l'appui de la banque mondiale	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (TDR)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (ACT)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (Artésunate)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (SP)	Proportion de formations sanitaires n'ayant pas connu de rupture de stocks d'intrants antipaludiques au cours du mois (MILDA)	Proportion de Femmes enceintes, ayant reçu une MILDA en routine	Proportion d'Enfants de moins d'un an, ayant reçu une MILDA en routine	Taux de complétude des rapports mensuels SNIS
Burkina Faso	1.2	94	142	103	22	32	0					54	13	98
Boucle du Mouhoun	1.1	101	94	110	17	26	0	85	46	81	67	84	85	10	101
Cascades	0.5	87	105	97	15	25	0	86	35	78	44	45	46	15	103
Centre	0.1	84	104	94	27	42	0	91	52	75	57	96	64	32	88
Centre-Est	1.0	100	96	106	36	50	0	83	36	59	42	60	45	8	99
Centre-Nord	1.3	96	105	100	36	46	0	88	57	88	71	65	44	21	101
Centre-Ouest	0.6	96	104	101	25	36	0	88	55	81	58	86	66	9	99
Centre-Sud	0.3	97	96	106	19	27	0	84	32	68	50	77	70	4	101
Est	1.0	99	91	116	14	22	0	91	58	82	60	68	45	2	96
Hauts-Bassins	0.5	86	164	95	29	43	0	89	43	63	49	71	37	58	90
Nord	0.7	101	95	109	17	24	0	75	37	66	42	71	44	3	99
Plateau Central	0.3	94	108	102	21	33	0	83	53	78	67	77	59	14	97
Sahel	1.9	91	109	97	6	13	0	87	50	70	58	74	58	27	98
Sud-Ouest	1.0	99	102	109	22	30	0	91	56	84	61	87	53	13	100
Source:	ENDOS-BF	ENDOS-BF / ENDOS-BF	ENDOS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	Rapport CPS	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF	ENDOS-BF