

Country indicators

Incidence annuelle du paludisme confirmé (dans les formations sanitaires et communauté) (Pour 1000)	Prévalence de la parasitémie : pourcentage d'enfant de moins de 5 ans avec une infection palustre (par microscopie et/ou TDR)	Proportion des MILDA qui ont été distribuées lors de la campagne de masse planifiée chaque 3 ans (par rapport aux nombres des MILDA planifiées à être distribuées)	Proportion de personnes à risque de paludisme, tous âges confondus, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête	Proportion d'enfants de moins de 5 ans à risque de paludisme ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête	Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête	Proportion de ménages disposant d'au moins une MILDA pour deux personnes	Taux d'exécution des activités du plan d'action annuel du PNLP	Proportion de personnes qui connaissent les mesures préventive et traitement du paludisme
	15.3%	94%	64%	56%	60%	44%	⬆93%	83%

Scorecard

Region	Gestion de Programme	Prevention chez la femme enceinte		Prevention chez l'enfant		Prise en charge				Impact				Lutte anti vectorielle	Suivi et évaluation	
	Proportion de tests de sensibilité des vecteurs aux insecticides réalisés dans les sites sentinelles selon le protocole de l'OMS	Pourcentage de femmes enceintes ayant reçu un TPI avec au moins 3 doses de SP lors des CPN dans les formations sanitaires	Proportion de femmes enceintes ayant bénéficié d'une MILDA au cours de la distribution durant la CPN	Proportion d'enfants de 3 à 59 mois des zones ciblées bénéficiant au moins 3 passages de la Chimio Prévention Saisonnière (CPS)	Proportion des enfants venus au PEV ayant bénéficié d'une MILDA de routine	Pourcentage de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un examen parasitologique (TDR ou GE) au niveau des formations sanitaires	Pourcentage de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un TDR au niveau communautaire	Proportion de cas confirmés de paludisme simple ayant reçu un traitement antipaludique au niveau des formations sanitaires selon les directives nationales	Proportion de cas confirmés de paludisme simple ayant reçu un traitement antipaludique au niveau des Agents communautaires selon les directives nationales	Proportion de positivité (GE/TDR) au niveau de formations sanitaires	Proportion de positivité (TDR) au niveau de communauté	Létalité due au paludisme confirmé	Taux d'incidence de paludisme	Proportion de ménages situés dans les zones ciblées pour la PIP ayant bénéficié de la pulvérisation intra domiciliaire au cours des 12 derniers mois	Taux de complétude	Taux de promptitude
Guinée	100	⬇72	89	0	⬆93	99	99	99	99	⬇68	⬇61	0.050	⬇326	0	100	⬆99
IRS Boké	100	⬇46	⬆66	0	⬆97	99	99	99	100	⬇70	⬇59	0.070	⬇550	0	100	⬆99
DSV Conakry	0	⬇64	94	0	102	98	100	98	100	⬇40	⬇62	⬇0.020	⬇211	0	100	⬆100
IRS Faranah	100	84	97	0	⬆86	99	⬆100	99	100	⬇72	70	⬆0.050	⬇254	0	100	⬆99
IRS Kankan	100	⬇69	83	0	⬆94	99	99	100	100	74	73	0.040	⬇337	0	100	⬆98
IRS Kindia	0	76	89	0	82	96	99	101	99	⬇77	⬇79	⬇0.040	⬇290	0	100	⬆100
IRS Labé	100	75	⬆122	0	95	99	99	100	⬆99	⬇55	⬇32	0.020	⬇257	0	100	⬆100
IRS Mamou	0	85	94	0	92	100	100	98	100	⬇77	⬇76	⬇0.030	⬇265	0	100	⬆100
IRS N'zérékoré	0	88	96	0	⬆98	99	99	99	99	79	73	⬆0.090	⬇469	0	100	⬆96
Source:	Rapport PNLP	SNIS	DHIS2	Rapport de campagne PNLP	DHIS2	SNIS	SNIS	SNIS	SNIS	SNIS	SNIS	SNIS	DHIS2	Rapport PNLP	DHIS2	DHIS2