Carte de Score Paludisme: Burundi (Q4/2023)

On track | Not applicable | Increase
Progress | No data | Decrease
Not on track

Indicateurs nationaux

Cas de paludisme confirmés (par microscopie ou test de dépistage rapide) pour 1000 habitants	Létalité liée au paludisme, parmi les cas hospitalisés pour le paludisme	Proportion des cas de décès liés au Paludisme parmi les malades hospitalisés pour 100.000 habitants par an	Taux de mortalité lié au paludisme dans les FOSA pour 100 000 habitants de moins de 5ans	Proportion de la population à risque ayant reçu au moins un cycle de PID au cours des 12 derniers mois dans les zones ciblées pour la PID
465	0.8			

Carte de score

Region	Prévention					Prise en charge					GAS	
	Proportion de femmes enceintes qui viennent en CPN1 et reçoivent les MIILDA	Proportion des enfants de 18 mois venant pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole qui reçoivent des MIILDA	Pourcentage de femmes bénéficiant de services de soins prénatals ayant reçu au moins 3 doses de traitement préventif intermittent	Proportion de cas suspect de paludisme soumis à un test parasitologique dans les formations sanitaires	Proportion de cas de paludisme simple confirmés ayant reçu un traitement antipaludique conformément à la politique nationale, dans le formations sanitaires	Proportion de cas de paludisme confirmés ayant reçu un traitement antipaludique de première intention conformément à la politique nationale, au niveau communautaire	Proportion de tests microscopiques réalisés dans les centres de santé	Proportion de TDR réalisées dans les centres de santé	Proportion de cas de paludisme simple confirmés chez les moins de 5ans ayant reçu un traitement antipaludique conformément à la politique nationale, dans le formations	Proportion de cas de paludisme confirmés chez les moins de 5ans ayant reçu un traitement antipaludique de première intention conformément à la politique nationale, au niveau	Pourcentage de formations sanitaires publique n'ayant pas connu de rupture de stock en ACT au cours de la période	Pourcentage formations sanitaires publique n'ayant pas connu de rupture de stock en TDR au cours de la période
Burundi			⬇83	99.6	92	102		79				
Bubanza			⬇73	99.8	⬆94	104		75				
Bujumbura			⬇75	98.3	⬆87	⬆112		62				
Bujumbura Mairie			⬇59	99.5	⬇55			31				
Bururi			⬇92	99.9	98	101		68				
Cankuzo			⬇38	99.8	⬇87	101		⬇82				
Cibitoke			⬆221	99.4	91	102		88				
Gitega			⬇66	99.8	⬆94	104		⬇67				
Karusi			⬆74	100.0	96	⬇103		85				
Kayanza			80	99.8	91	97		⬇69				
Kirundo			⬆111	99.3	90	104		92				
Makamba			⬇80	99.6	⬇84	102		68				
Muramvya			⬇50	100.0	⬆99	101		78				
Muyinga			⬇113	99.5	95	102		82				
Mwaro			⬇43	99.7	⬇86	⬆113		83				
Ngozi			58	99.8	95	99		88				
Rumonge			⬇104	99.7	94	97		75				
Rutana			⬇79	99.2	⬆99	100		83				
Ruyigi			⬇48	100.0	91	⬇98		87				
_(MSPLS/UP du NC)												
Source:	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2	DHIS2