# Malária: Angola (T4/2024)

Sur la voie
Progrès
Pas sur la voie
N'est pas applicable
No data
↑ Hausse
↓ Baisse

## Indicateurs nationaux

## Carte de score

| Region | PNCM - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Porcentagem de mulheres grávidas que receberam MILDA durante CPN | TPI3 | Taxa de positividade | Casos confirmados de malária tratados com ACT (todas as idades) | Total de casos de malária (confirmados + clínicos) | % de casos de malaria confirmados tratados com CTA | Taxa de letalidad intrahospitalar en menores de 5 anos | Taxa de letalidad |
| Angola | ↓24 | | ↑54 | ↑2,382,983 | ↑3,031,955 | 85 | 2 | 2 |
| Bengo | 20 | | ↓73 | ↑71,114 | ↑98,400 | 91 | ↑2 | 2 |
| Benguela | ↓48 | | ↑44 | ↑158,714 | ↑218,223 | 82 | ↓1 | 1 |
| Bié | ↑50 | | ↑66 | ↑224,423 | ↑266,384 | 95 | 2 | 2 |
| Cabinda | 10 | | ↓58 | ↑48,588 | ↑101,773 | 50 | 2 | 1 |
| Cuando Cubango | 30 | | ↑64 | ↓12,344 | ↓13,691 | ↑99 | ↓1 | ↓0 |
| Cuanza-Norte | ↓70 | | ↑56 | ↑121,754 | ↑121,864 | 100 | ↑3 | 2 |
| Cuanza-Sul | 81 | | ↑56 | ↑184,743 | ↑236,175 | 88 | 2 | 1 |
| Cunene | 5 | | ↑33 | 17,545 | ↑23,209 | 87 | 5 | 5 |
| Huambo | ↓2 | | ↑59 | ↑182,350 | ↑270,443 | 76 | 2 | 2 |
| Huíla | ↓7 | | ↑43 | ↑104,445 | ↑147,922 | 83 | ↓6 | 5 |
| Luanda | ↓5 | | ↓47 | ↓285,910 | ↓386,339 | 75 | ↑2 | 3 |
| Lunda-Norte | ↓26 | | ↑49 | ↑94,873 | ↑107,430 | 89 | 4 | ↓3 |
| Lunda-Sul | ↓22 | | ↑49 | ↑74,438 | ↑99,311 | ↓75 | ↓1 | ↓1 |
| Malange | ↓24 | | ↑67 | ↑241,500 | ↑252,751 | 96 | ↑3 | 3 |
| Moxico | 9 | | ↓38 | ↑26,619 | ↓44,876 | ↑91 | ↑3 | 3 |
| Namibe | ↓1 | | ↓43 | ↑15,225 | ↑33,057 | 48 | ↑2 | 2 |
| Uíge | ↓39 | | ↑62 | ↑314,838 | ↑329,117 | 97 | ↑2 | 2 |
| Zaire | 37 | | ↑53 | ↑79,296 | ↑87,848 | 91 | 1 | 1 |
| Source: | DHIS2 | DHIS2 | DHIS2 | DHIS2 | DHIS2 | DHIS2 | DHIS2 | DHIS2 |